INFORMACIÓN GENERAL

GLIFOSATO II

La nueva formulación de GLIFOSATO ATANOR II posee la misma capacidad herbicida que el Glifosato ATANOR (ver el equivalente ácido), pero con una mayor efectividad. Esto se debe a que el nuevo Glifosato Atanor II posee una molécula más chica que favorece la penetración y movilización del herbicida dentro del vegetal.
Por ello, GLIFOSATO ATANOR II es un herbicida no selectivo para el control postemergente de las malezas anuales y perennes en áreas agrícolas, industriales, caminos, vías férreas, etc.
De acción sistémica, es absorbido por hojas y tallos verdes y traslocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas ya que se produce la inhibición de la síntesis de aminoácidos.
Se presenta formulado como concentrado soluble que incluye un surfactante, de modo que no es necesario agregar tensiactivos. Únicamente se recomienda el uso de un surfactante no iónico cuando el producto se aplique con aguas duras o salobres.

COMPOSICIÓN

Glifosato *(sal monopotásica de glifosato)*	*43,8 gr**
Inertes y coadyuvantes c.s.p	*100 ml*
*Equivalente en ácido N-fosfonometil glicina	*35,6 gr*

MALEZAS QUE CONTROLA Y DOSIS

Malezas anuales	Dosis
Capín *(Echinochloa colonum)*	2 - 3 litros por ha.
Capín *(Echinochloa crus galli)*	2 - 3 litros por ha.
Cebadilla criolla *(Bromus unioloides convolvulus)*	2 - 3 litros por ha.
Cola de zorro *(Setaria spp. aviculare)*	2 - 3 litros por ha.
Pasto cuaresma *(Digitaria spp)*	2 - 3 litros por ha.
Yuyo colorado *(Amaranthus sp.)*	2,5 - 4 litros por ha.
Quinoa *(Chenopodium spp.)*	2,5 - 4 litros por ha.
Enredadera anual *(Polygonum)*	2,5 - 4 litros por ha.
Sanguinaria *(Polygonum)*	2,5 - 4 litros por ha.
Amor seco *(Bidens pilosa)*	2,5 - 4 litros por ha.
Malezas perennes	**Dosis**
Sorgo de alepo *(Sorghum halepense)*	2,5 - 4 litros por ha.*
Gramón *(Cynodon dactylon)*	6 litros por ha.
Cebollín *(Cyperus rotundus)*	6 litros por ha.
Cípero *(Cyperus sculentus)*	6 litros por ha.
Camalote *(Panicum maxicum)*	6 litros por ha.
Yuyo sapo *(Wedelia glauca)*	6 litros por ha.

**Dosis recomendada para sorgo de Alepo no resistente al Glifosato. Ante la probable aparición de biotipos resistentes se recomienda consultar al asesor técnico de confianza sobre la combinación de productos y métodos de manejo cultural más recomendables.*

APLICACIÓN EN COBERTURA TOTAL

Aplicaciones terrestres: Con equipos pulverizadores terrestres debe utilizarse la dosis recomendada, diluida en agua limpia, a razón de 80-120 l/ha. Las pastillas recomendadas son las de abanico plano (N°: 80-03, 80-02, 110-02, 110-03) trabajando a una presión entre 25 y 40 libras por pulgada cuadrada. Para preparar la solución de aspersión debe llenarse el depósito con agua hasta la mitad, agregarse la dosis recomendada de GLIFOSATO ATANOR II y completarse el llenado. Debido a la alta solubilidad de GLIFOSATO ATANOR II es suficiente la agitación provista por el retorno de la pulverizadora.

Aplicaciones aéreas: se deben aplicar volúmenes totales entre 15 y 30 litros por hectárea (dosis de GLIFOSATO ATANOR II más agua); observando las precauciones habituales en cuanto a horario, altura de vuelo, tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas.

UTILIZACIÓN EN MEZCLAS

GLIFOSATO ATANOR II es compatible con productos residuales o sistémicos formulados como concentrados solubles y concentrados emulsionables. Se ha observado retraso en la actividad de **GLIFOSATO ATANOR II** en combinación con productos formulados como suspensiones acuosas, concentrados floables, gránulos dispersables y polvos mojables. Antes de utilizar estas combinaciones consulte previamente a un representante técnico de **Atanor**.
Para combinar con herbicidas formulados en base a la sal amina del ácido 2,4 D se recomienda utilizar por lo menos 60 lts de agua/ha. En dosis superiores a 3 l/ha de glifosato y 0,8 l/ha de la sal amina del ácido 2,4 D se recomienda subir el volumen de agua. En esta combinación no se recomienda el uso de coadyuvantes en base a sulfato de amonio, el agregado de más productos al caldo, ni su uso en las diluciones utilizadas en la aplicación aérea.
Si se va a utilizar en combinación con otros productos agregar después de gránulos dispersables, polvos mojables, suspensiones acuosas concentradas y antes de los concentrados emulsionados.

GLIFOSATO II

Datos técnicos

www.atanor.com.ar

ATANOR

ATANOR