

## INFORMACIÓN GENERAL



Herbicida selectivo que controla principalmente malezas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales en los cultivos de maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. Actúa inhibiendo la fotosíntesis de las malezas.

TRAC 50 FL es un herbicida a base de Atrazina que presenta las siguientes ventajas:

- Por la calidad del formulado, no requiere de una premezcla.
- Es absorbido principalmente por las raíces y también penetra en menor medida a través de las hojas, traslocándose por el interior de las plantas.
- Es selectivo debido a la capacidad por parte de los cultivos en los que se usa de metabolizar este herbicida, transformándolo en compuestos no tóxicos.
- No es volátil, evitándose daños en cultivos susceptibles.

## COMPOSICIÓN

Atrazina (2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-s-triazina)	50 gr
Agua y humectantes c.s.p.	100 ml

## MALEZAS QUE CONTROLA

Abrojo (*Xanthium cavanillesi*)  
Alfilerillo (*Erodium cicutarium*)  
Bolsa del pastor (*Capsella bursa-pastoris*)  
Caapiqui (*Stellaria media*)  
Cardo blanco (*Silybum marianum*)  
Cardo ruso (*Salsola kali*)  
Cepa caballo (*Xanthium spinosum*)  
Cerraja (*Sonchus oleraceus*)  
Cola de zorro (*Setaria spp.*)  
Chamico (*Datura ferox*)  
Equinocloa (*Echinochloa spp.*)  
Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*)  
Gramilla dulce (*Paspalum distichum*)  
Grama rodes (*Chloris gayana*)  
Lengua de vaca (*Rumex crispus*)  
Lecherón (*Euphorbia dentata*)

Lupulina o trébol (*Medicago lupulina*)  
Malva (*Anoda cristata*)  
Manzanilla (*Anthemis cotula*)  
Masfuerzo (*Coronopus didymus*)  
Nabo (*Brassica spp.*)  
Ortiga (*Urtica urens*)  
Pasto de invierno (*Poa annua*)  
Perejillo (*Bowlesia tenera*)  
Quinoa o avaja (*Chenopodium spp.*)  
Revienta caballo o Pocotillo (*Solanum eleagnifolium*)  
Sanguinaria o cien nudos (*Polygonum aviculare*)  
Verdolaga (*Portulaca oleracea*)  
Yuyo colorado o ataco (*Amaranthus spp.*)  
Zapallo amargo (*Curcubita andreanna*)

## CULTIVOS Y DOSIS

### Maíz:

\*Banda de 35 cm.

Tratamiento	Dosis: l/ha. según el tipo de suelo.					
	Liviano		Medio		Pesado	
	Total	Banda*	Total	Banda*	Total	Banda*
Pre-Siembra	4		5		5	
Pre-Emergencia	3,2	2	4	2,5	5	3,6
Post-Emergencia Temprana	4		4		4	

Zona Maicera de Buenos Aires y Santa Fe.

En las siembras tempranas (septiembre) o épocas de escasas lluvias, realizar tratamiento de pre-siembra incorporando el herbicida. En siembras normales (fin de septiembre/octubre) aplicar en pre-emergencia. Logrando una cobertura de 20-30 gotas/cm<sup>2</sup>.

### Sorgo granifero:

Tratamiento	Dosis: l/ha. según el tipo de suelo.	
	Medio	Pesado
Pre-Siembra	3,2	4,8
Pre-Emergencia	2-4	2-4

Efectuar aplicaciones preferentemente en pre-siembra incorporando TRAC 50 FL 2 a 3 semanas antes de la siembra o en su post-emergencia temprana (cultivo 3-4 hojas). Logrando una cobertura de 20-30 gotas/cm<sup>2</sup>. Recomendamos precaución en aplicaciones de pre-emergencia luego de sembrar y cuando esta coincide con bajas temperaturas y precipitaciones abundantes, puesto que puede presentarse fitotoxicidad, sobre todo en suelos livianos.

### Caña de azúcar:

\*Banda de 70 cm por surco de 100 m de largo.

Tratamiento	Dosis: l/ha. según el tipo de suelo.			
	Liviano		Pesado	
	Total	Banda*	Total	Banda*
Pre-Siembra	6	40cc	8	40cc

Pre-emergencia después de un riego o una lluvia. Post-emergencia de los brotes hasta que las malezas latifoliadas tengan 1 a 2 hojas.

## Utilización en mezclas

Se recomienda realizar siempre una prueba previa de compatibilidad antes de hacer las combinaciones en el tanque de la pulverizadora.



**50 FL**  
**TRAC**

[www.atanor.com.ar](http://www.atanor.com.ar)

**Datos técnicos**

